

2015 - Vacunas recomendadas para adultos según la edad

Si su edad es, **hable con su profesional de salud acerca de estas vacunas** →

Si su edad es, ↓	Influenza (gripe)	Td/Tdap Tétanos, difteria, tosferina	Culebrilla Herpes zóster	Antineumocócica		Antimenin-gocócica	MMR Sarampión, paperas, rubéola	VPH <i>Virus del papiloma humano</i>		Varicela Varicela	Hepatitis A	Hepatitis B	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
				PCV13	PPSV23			para mujeres	para hombres				
19-21 años									3 dosis				
22-26 años							1 o 2 dosis	3 dosis	3 dosis				
27-49 años		1 dosis de Tdap*			1 dosis	1 o 2 dosis	1 o más dosis						
50-59 años	Vacuna contra la influenza todos los años	Refuerzo de la Td cada 10 años								2 dosis	2 dosis	3 dosis	1 o 3 dosis
60-64 años			1 dosis										
65+ años				1 dosis	1 dosis								

Más información:

Hay varias vacunas contra la influenza. Pregúntele a su profesional de salud cuál es la adecuada para usted.

* Si está embarazada, debe recibir la vacuna Tdap durante el **3.º trimestre de cada embarazo** para ayudar a proteger a su bebé de la tosferina (*pertussis* o tos convulsiva).

Usted debe recibir la vacuna contra el herpes zóster, aunque ya haya tenido culebrilla.

Hay dos tipos diferentes de vacunas antineumocócicas: PCV13 (conjugada) y PPSV23 (polisacárida). Hable con su profesional de salud para saber si le recomiendan una vacuna o las dos.

Su profesional de salud le dirá cuántas dosis necesita.

Si usted nació en 1957 o después y no tiene un registro de haber sido vacunado contra o de haber tenido sarampión, paperas y rubéola, pregúntele a su profesional de salud cuántas dosis puede necesitar.

Recomendada para usted si no la recibió cuando era niño.

Hay dos vacunas contra el VPH, pero solo una (Gardasil®) se les debe administrar a los hombres.

Si usted es un hombre de 22 a 26 años y tiene relaciones sexuales con hombres, debería completar la serie de vacunas contra el VPH si todavía no lo ha hecho.

Su profesional de salud le dirá cuántas dosis necesita.

Recomendada para usted: Esta vacuna se recomienda para usted **a menos** que su profesional de salud le diga que no es seguro recibirla o que no la necesita.

Puede ser recomendada para usted: Esta vacuna se recomienda esta vacuna para usted, si tiene ciertos factores de riesgo debido a su salud, trabajo o estilo de vida que no se mencionan aquí. Hable con su profesional de salud para saber si necesita esta vacuna.

Si va a viajar fuera de los Estados Unidos, puede que necesite vacunas adicionales.

Al menos 6 semanas antes de su viaje, pregúntele a su profesional de salud cuáles vacunas puede necesitar.

Para obtener más información, llame al
1-800-CDC-INFO
(1-800-232-4636) o visite www.cdc.gov/vaccines



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

2015 - Vacunas recomendadas para adultos según estado de salud

Si usted tiene esta afección o estado de salud, hable con su profesional de salud acerca de estas vacunas

	Influenza (gripe)	Td/Tdap Tétanos, difteria, tosferina	Culebrilla Herpes Zóster	Antineumocócica		Antimenin-gocócica	MMR Sarampión, paperas, rubéola	VPH <i>Virus del papiloma humano</i>		Varicela Varicela	Hepatitis A	Hepatitis B	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
				PCV13	PPSV23			para mujeres	para hombres				
Embarazo		*ver abajo			1 o 2 dosis								
Sistema inmunitario debilitado			NO DEBE VACUNARSE				NO DEBE VACUNARSE		3 dosis hasta los 26 años	NO DEBE VACUNARSE		3 dosis	Solo receptores pos TCPH
VIH: El número de CD4 es menos de 200						1 o más dosis							
VIH: El número de CD4 es 200 o más		1 dosis de Tdap seguida de una dosis de la Td de refuerzo cada 10 años		1 dosis							2 dosis	3 dosis	1 o 3 dosis
Enfermedad renal o funcionamiento renal deficiente	Vacuna contra la influenza todos los años			1 o 2 dosis				3 dosis hasta los 26 años	3 dosis hasta los 21 años	2 dosis			
Asplenia (si usted no tiene bazo o si este no funciona bien)			1 dosis para las personas de 60 años o más			1 o más dosis	1 o 2 dosis					3 dosis	1 o 3 dosis
Enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, alcoholismo crónico													1 o 3 dosis
Diabetes (tipo 1 y tipo 2)				1 dosis		1 o más dosis						3 dosis	
Enfermedad hepática crónica											2 dosis		

Más información:

Hay varias vacunas contra la influenza. Pregúntele a su profesional de salud cuál es la adecuada para usted.

* Si está embarazada, debe recibir la vacuna Tdap durante el 3.º trimestre de cada embarazo para ayudar a proteger a su bebé de la tosferina (*pertussis* o tos convulsiva).

Usted debe recibir la vacuna contra el herpes zóster, aunque ya haya tenido culebrilla.

Hay dos tipos diferentes de vacunas antineumocócicas: PCV13 (conjugada) y PPSV23 (polisacárida). Hable con su profesional de salud para saber si le recomiendan una vacuna o las dos.

Su profesional de salud le dirá cuántas dosis necesita.

Si usted nació en 1957 o después y no tiene un registro de haber sido vacunado contra o de haber tenido sarampión, paperas y rubéola, pregúntele a su profesional de salud cuántas dosis puede necesitar.

Recomendada para usted si no la recibió cuando era niño.

Hay dos vacunas contra el VPH, pero solo una (Gardasil®) se les debe administrar a los hombres.

Si usted es un hombre de 22 a 26 años y tiene relaciones sexuales con hombres, debería completar la serie de vacunas contra el VPH si todavía no lo ha hecho.

Su profesional de salud le dirá cuántas dosis necesita.

*Trasplante de células madre hematopoyéticas

Recomendada para usted: Esta vacuna se recomienda para usted **menos** que su profesional de salud le diga que no es seguro recibirla o que no la necesita.

Puede ser recomendada para usted: Esta vacuna se recomienda para usted, si tiene ciertos factores de riesgo debido a su edad, salud, trabajo o estilo de vida que no se mencionan aquí. Hable con su profesional de salud para saber si necesita esta vacuna.

NO DEBE VACUNARSE

Si va a viajar fuera de los Estados Unidos, puede que necesite vacunas adicionales.

Al menos 6 semanas antes de su viaje, pregúntele a su profesional de salud cuáles vacunas puede necesitar.

Para obtener más información, llame al
1-800-CDC-INFO

(1-800-232-4636) o visite www.cdc.gov/vaccines



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention